

服用清血类药物者须知

根据服用的药物种类，可能出现止血困难的情况，因此需要您在预诊票上填写药物的种类。

此类人群可接种疫苗，但是需要注意接种后的出血情况。

疫苗接种时（肌肉注射）的注意事项



疫苗接种后，请牢牢按压2分钟以上。

- 若出现手臂肿胀、发麻等症状，请咨询医生。
- 无需为了接种疫苗而停药。

注意
对象

抗凝血药

心律不齐、血栓症、心脏手术后的人群的常用处方药。

商品名	一般名
华法林	华法令钾
泰毕全/百达生	达比加群酯
拜瑞妥	利伐沙班
艾乐妥	阿哌沙班
里先安	甲苯磺酸艾多沙班

清血类药物，还有以下这些，
均可以正常接种。

抗血小板药物等

动脉硬化、心绞痛・心肌梗塞、脑梗塞后、下肢动脉闭塞症的人群的常用处方药。

商品名	一般名	商品名	一般名
拜阿司匹林	阿司匹林	ComPlavin 复方片	阿司匹林・硫酸氢氯吡格雷
Panaldine	盐酸噻氯匹定	TAKELDA 复方片	阿司匹林・兰索拉唑
波立维	硫酸氢氯吡格雷	EPADEL	二十碳五烯酸乙酯（EPA）
EFIENT	盐酸普拉格雷	德纳、PROCYLIN	贝前列素钠
培达	西洛他唑	安步乐克	盐酸沙格雷酯
百服宁	阿司匹林・二铝酸复方制剂		
倍林达	替格瑞洛		

等等